

## METAPLASTİK MEME KANSERİ: PROGNOSTİK VE TERAPÖTİK DEĞERLENDİRMELER

DOI: 10.1002/jso.26248

**Giriş:** Metaplastik meme kanseri (MBC), daha kötü prognozlu bir hastalık olarak değerlendirilen, meme tümörünün farklı alt tiplere sahip nadir görülen bir durumudur; tedavi ve sağ kalım genelde belirsiz ve tartışmalıdır.

**Metod:** Farklı alt türlerden 153 primer MBC yi topladık. Genel sağkalım (OS) ve invaziv hastalıksız sağkalımı (IDFS) değerlendirmek için meme cerrahisi, neoadjuvan veya adjuvan tedavi, klinik-patolojik faktörler, takip sırasındaki olayların sayısı ve türü değerlendirildi.

**Sonuçlar:** MBC nin büyük çoğunluğu triple negatif (TN) alt tipe (%88.7), G3 (%95.3), pN0(%70.6) ve yüksek Ki-67 (%93.5) düzeyine sahipti. OS ve IDFS için, farklı MBC alt tipleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Eşleştirilmiş triple negatif MBC (TNMBC) ve duktal TNBC kohortları hem OS ( $p=0.411$ ) hem de IDFS ( $p=0.981$ ) açısından benzer prognoza sahipti. Siklofosamid, metotreksat, 5-florourasil protokolü ile adjuvan tedavi alan TNMBC hastaları için daha iyi OS ( $p=0.090$ ) ve IDFS 'ye ( $p=0.087$ ) yönelik pozitif bir eğilim gözlemledik. Neoadjuvan tedavi ortamında yanıt oranı zayıf veya yanıtız olarak gözlemlendi.

**Tartışma:** Sonuçlarımız, TN fenotipli metaplastik ve duktal meme kanserinin genel ve hastalıksız sağkalım açısından benzer olduğunu gösterdi. Metaplastik kanserler neoadjuvan tedaviye zayıf yanıt verirler ve yeni hedefe yönelik tedavilerin yokluğunda cerrahi tedavi ilk seçenek olmaya devam eder.